

8 Normy mimo normu (30 bodů)

Na cvičeních jsme charakterizovali všechny skalární součiny $\langle \mathbf{x} | \mathbf{y} \rangle$ pomocí symetrických pozitivně definitních matic A jako $\mathbf{x}^\top A \mathbf{y}$. Také jsme zmínili, že každý skalární součin $\langle \mathbf{x} | \mathbf{y} \rangle$ indukuje normu $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x} | \mathbf{x} \rangle}$. Norem je však mnohem více než skalárních součinů, neboť ne každá norma je spojena se skalárním součinem. V této úloze dokážeme úplnou charakterizaci norem v \mathbb{R}^n .

8.1 Definice normy

Připomeňme si nejprve definici normy. Norma $\|\cdot\|$ je zobrazení $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, které splňuje tři podmínky:

- (i) *Nezápornost*: pro každé $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ je $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ a pro $\mathbf{x} \neq 0$ dokonce $\|\mathbf{x}\| > 0$.
- (ii) *Linearita*: pro každé $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ a $\alpha \in \mathbb{R}$ je $\|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \cdot \|\mathbf{x}\|$.
- (iii) *Trojúhelníková nerovnost*: pro každé $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ platí, že $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$.

Příklady norem jsou standardní norma

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} = \mathbf{x}^\top \mathbf{x},$$

A -norma $\|\mathbf{x}\|_A = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}$ (kde A je symetrická pozitivně definitní matice) a ℓ_p norma

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(|x_1|^p + \cdots + |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$


pro $p \in [1, \infty]$.

8.2 Sféry a koule

Mějme normu $\|\cdot\|$. Zavedeme následující značení:

$$S_r = \{\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{x}\| = r\}, \quad B_r = \{\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{x}\| \leq r\}.$$

Množina S_r je sféra o poloměru r , a B_r je koule o poloměru r . Na obrázku jsou sféry S_1 pro různé normy.



Pokud zvolíme normu libovolného vektoru $\|\mathbf{x}\|$, vyplývá z linearity (i) také norma všech jeho násobků, tedy určili jsme normu pro celou přímku procházející počátkem. Pokud předepřeme normu na každé z těchto přímek, je celá norma určená, ale musíme to udělat konzistentně, aby byla splněna trojúhelníková nerovnost. Jinými slovy norma je jednoznačně určena její jednotkovou sférou S_1 .

Udělejme malou odbočku. Množina M se nazývá *konvexní*, pokud pro libovolné dva vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in M$ patří úsečka $\{t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y} : t \in [0, 1]\}$ do množiny M . Popišme paralelu s vektorovými podprostupy. Vektorový podprostor je množina vektorů uzavřená na lineární kombinace. Pro konvexní množiny platí, že jsou uzavřené na konvexní kombinace. To jsou lineární kombinace $t_1\mathbf{x}_1 + \dots + t_k\mathbf{x}_k$, které navíc splňují, že $t_1 + \dots + t_k = 1$ a $t_i \geq 0$.

Úloha 8.1. Dokažte následující vlastnosti pro libovolnou normu $\|\cdot\|$:

- (a) Počátek $\mathbf{0} \notin S_r$ pro libovolné $r > 0$.
- (b) Množiny S_r a B_r jsou symetrické podle počátku, tedy $-S_r = S_r$ a $-B_r = B_r$.
- (c) Množina B_r je konvexní.

Nyní přeformulujme vlastnost, že B_r je konvexní.

Úloha 8.2. Nechť $\|\cdot\|$ je libovolné zobrazení $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, které splňuje (i) a (ii). Dokažte, že B_r je konvexní pro libovolné $r > 0$, právě když

$$\|t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y}\| \leq t\|\mathbf{x}\| + (1-t)\|\mathbf{y}\|,$$

kdykoliv $t \in [0, 1]$.

8.3 Charakterizace všech norem

Nyní si ukážeme charakterizaci norem. Již víme, že každá norma definuje koule B_r , které jsou konvexní a symetrické podle počátku. Naopak libovolná jedna taková koule již jednoznačně určuje normu:


Úloha 8.3. Nechť B_1 je uzavřená omezená konvexní podmnožina \mathbb{R}^n , symetrická podle počátku. Nechť S_1 je hranice B_1 a nechť $\mathbf{0} \notin S_1$. Definujme zobrazení $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ následovně:

$$\|\mathbf{x}\| = |\alpha|, \quad \text{kde } \mathbf{x} = \alpha \mathbf{y} \text{ a } \mathbf{y} \in S_1.$$

Dokažte, že $\|\cdot\|$ je norma.

Ná pověda. Je snadné ověřit, že $\|\cdot\|$ splňuje vlastnosti (i) a (ii). S využitím úlohy 6.2, vhodným dosazením za t , lze získat trojúhelníkovou nerovnost (iii).

Ukázali jsme, že normy mohou být oproti skalárním součinům velice složité. Zakončeme tuto úlohu příkladem několika „divných“ norem, které nejdou popsat žádným ze vzorečků na začátku zadání úlohy.



9 Determinant je multilineární alternující forma (40 bodů)

Těmito slovy by vám algebraik pravděpodobně popsal determinant. Definice je na jednu stranu krátká a jednoduchá, na druhou stranu člověku neznámému těchto pojmu neřekne absolutně nic. Naším cílem v této úloze bude si tuto alternativní definici představit a ukázat ekvivalence s typickou definicí determinantu pomocí formule

$$\det(A) = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \prod_{i=1}^n a_{i,\pi(i)}. \quad (\clubsuit)$$

Z formule vyvodíme (s trohou práce) vlastnosti determinantu, pomocí kterých ho můžeme spočítat. Na druhou stranu vůbec není vidět, kde se tato formule vzala a proč zrovna takhle je zajímavá; což bude mnohem zřejmější z algebraického přístupu pomocí multilineárních forem.

Jednotlivé vlastnosti si proto budeme ilustrovat na maticích 2×2 , kde můžeme snadno zkонтrolovat, že je determinant definovaný (\clubsuit) splňuje:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

9.1 Definice determinantu pomocí vlastností

Zkusíme determinant nadefinovat pomocí vlastností, které splňuje. Pro jednoduchost budeme pracovat nad tělesem reálných čísel.¹ Determinant \det je libovolné zobrazení

$$\det : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R},$$

které splňuje následující tři vlastnosti. Tedy determinant přiřazuje čtvercovým maticím reálná čísla. Formálně máme jednu definici determinantu pro každou velikost čtvercové matice, což budeme ignorovat. Tři vlastnosti jsou tyto:

- (1) Determinant je lineárně závislý na prvním řádku matice:

$$\begin{vmatrix} a+a' & b+b' \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a' & b' \\ c & d \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} \gamma \cdot a & \gamma \cdot b \\ c & d \end{vmatrix} = \gamma \cdot \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

Tedy násobky řádků můžeme z determinantu vytknout a podobně můžeme rozdelením řádku rozdělit jeden determinant na součet dvou determinantů. Pozor, rozhodně z toho nevyplývá, že $\det(A+B) = \det(A)+\det(B)$, můžeme aplikovat pouze na jeden řádek naráz. Této vlastnosti se říká *linearita prvního řádku* a drobnou úpravou (1) na (1') dostaneme slibovanou *multilinearitu*.

- (2) Determinant je *alternující*; prohození dvou řádků matice změní znaménko determinantu.

$$\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

- (3) Determinant jednotkové matice $\det(I_n)$ je roven jedné.

$$\begin{vmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \begin{vmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \dots$$

Podle vlastností (1) a (2) je determinant překvapivě určený jednoznačně až na přeškálování. Poslední vlastnost fixuje hodnotu determinantu nějaké matice.

V případě našeho odvození se ukazují dvě potíže algebraického přístupu. Předně ani nevíme, jestli existuje nějaké funkce splňující vlastnosti (1) až (3) (což víme podle znalosti formule (\clubsuit), kterou však nebudeme chtít používat). Také zatím nevíme, zda je determinant určený jednoznačně.

¹Definici determinantu lze samozřejmě zobecnit i pro ostatní tělesa. Jediný rozdíl je, že nad tělesem charakteristiky dva (např. \mathbb{Z}_2) se uvažuje místo vlastnosti (2) vlastnost (4).

9.2 Odvození dalších vlastností

Začneme tím, že z vlastností (1) až (3) odvodíme další základní vlastnosti determinantu.

Úloha 9.1. Dokažte následující vlastnosti (1') a (4) až (10).

Poznámka. V jejich důkazu nemůžete používat nic jiného než vlastností (1) až (3) a vlastnosti již dokázaných. Pokud se nepodaří některou vlastnost dokázat, můžete ji přeskočit a dále používat (čímž pochopitelně dostanete méně bodů).

- (1') První řádek není v ničem speciální, determinant je lineárně závislý na libovolném řádku matice. Této vlastnosti se říká *multilinearita*.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c + c' & d + d' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b \\ c' & d' \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a & b \\ \gamma \cdot c & \gamma \cdot d \end{vmatrix} = \gamma \cdot \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

- (4) Pokud má determinant nulový řádek, je roven nule.

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{vmatrix} = 0.$$

- (5) Pokud má determinant dva řádky stejné, je roven nule.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ a & b \end{vmatrix} = 0.$$

- (6) Přičtení libovolného násobku jednoho řádku k jinému nemění determinant.

$$\begin{vmatrix} a + \gamma \cdot c & b + \gamma \cdot d \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

- (7) Determinant trojúhelníkové matice T (horní či dolní) je roven součinu prvků na hlavní diagonále; $\det(T) = t_{1,1} \cdot t_{2,2} \cdots t_{n,n}$.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d \end{vmatrix} = ad.$$

- (8) Determinant umožňuje testovat regularitu. Je nenulový právě tehdy, když je matice regulární.

Ná pověda. Aplikujte Gaussovou eliminaci, která nemění determinant (nebo alespoň nemění ne-nulovost). Jak dopadne, pokud je matice regulární? Jaký výsledek dostaneme pro singulární matici?

Poznámka. Z výše uvedených vlastností již vyplývá jednoznačnost determinantu. Totíž aplikováním Gaussovy eliminace získáme, že determinant je (až na znaménko) součin pivotů. Pro daný postup Gaussovy eliminace proto vždy získáme stejné číslo a determinant musí být určený jednoznačně. Protože však Gaussovou eliminaci můžeme provádět různým způsobem, není jasné, zda vždy dostaneme stejné číslo, a tedy jestli je determinant vůbec *dobře zadefinovaný*. Mohlo by se ještě stát, že nebude existovat žádná funkce splňující vlastnosti (1) až (3).

- (9) Determinant součinu dvou matic je součin jejich determinantů, tedy platí $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{vmatrix} &= (ae + bg)(cf + dh) - (af + bh)(ce + dg) = \\ &= (ad - bc)(eh - fg) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} e & f \\ g & h \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Ná pověda. Lze například postupovat následujícím trikem. Případ, kdy je B singulární, vyřešíme zvlášť. Pokud je B regulární, definujme zobrazení d :

$$d(A) = \frac{\det(AB)}{\det(B)}.$$

Potřebujeme pouze dokázat, že zobrazení d splňuje vlastnosti (1) až (3). Potom z jednoznačnosti determinantu dostaneme, že $d = \det$ (a teoreticky by ani jedna z funkcí nemusela vůbec existovat).

Matice P_π je permutační (odvozená od permutace π), pokud má v každém řádku a sloupci obsahuje právě jednu jedničku a na ostatních pozicích nuly; podrobněji v úloze 2 z první série.

Úloha 9.2. Jak vypadá determinant permutační matice P_π ? Zkuste dokázat jak pomocí vlastností, tak pomocí definice (♣).

Zbývá ukázat poslední vlastnost (10) a tím bude náš seznam vlastností úplný.

(10) Determinant matice i její transpozice je stejný, tedy $\det A = \det A^T$.

Ná pověda. Problém je, že všechny předchozí vlastnosti determinantu hovoří o řádcích matic. Důkaz však lze založit na LDU dekompozici, kterou jsme si ukazovali na cvičení. Singulární případ A vyřešíme zvlášť. Pro každou regulární matici A platí

$$PA = LDU,$$

kde P je vhodná permutační matice, L je dolní a U je horní trojúhelníková matice s jednotkovou diagonálou a D je diagonální matice obsahující pivety. Důkaz se provede aplikováním transpozice na LDU dekompozici a porovnáním determinantů.

Poslední vlastnost (10) prakticky zdvojuje seznam vlastností, které o determinantu známe. Získáváme podobné vlastnosti o sloupečcích matic: Determinant je lineárně závislý na libovolném sloupečku; pokud je libovolný sloupeček nulový nebo jsou dva sloupečky stejné, je determinant nulový; ...

9.3 Ekvivalence s definicí pomocí formule (♣)

Zbývá dokázat, že determinant definovaný vlastnostmi (1) až (3) splňuje formuli (♣).

Úloha 9.3. Dokažte, že determinant definovaný (1) až (3) je ekvivalentní s definicí (♣).

Ná pověda. Rozdělíme výpočet jednoho determinantu na výpočet n^n determinantů. Podle vlastnosti (1) rozdělíme determinant na n determinantů, každý z nich obsahuje pouze jedno číslo z prvního řádku a na zbývajících pozicích nuly:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

Stejně tak rozdělíme i ostatní řádky, každý na n dalších determinantů:

$$\begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{vmatrix}.$$

Tak získáme n^n matic (každá obsahuje právě jeden koeficient původní matice v každém řádku), jejichž determinanty budou triviální. Část z nich bude nulových a ty zbývající budou členy sumy (♣). Například pro výše uvedený determinant dostáváme

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 0 + ad - bc + 0 = ad - bc.$$

10 Hadamardovy matice dají nejvíce! (30 bodů)

V této úloze se budeme zabývat speciálními čtvercovými maticemi, které se nazývají Hadamardovy. Mají překvapivě zajímavou kombinatorickou strukturu a používají se například v teorii samoopravných kódů nebo ve statistice. Jeden ze základních otevřených problémů je, pro které velikosti vůbec existují. Ukážeme si konstrukci pro velikosti ve tvaru 2^k a také překvapivou souvislost Hadamardových matic s determinantem.

Definice. Matice $H \in \{-1, 1\}^{n \times n}$ se nazývá *Hadamardova*, pokud platí

$$HH^\top = H^\top H = nI_n.$$

Tedy Hadamardova matice je tvořena ± 1 a má ortogonální řádky a sloupce.

Například Hadamardova matice řádu dva vypadá takto: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Nejprve vypozorujme:

Úloha 10.1. Nechť H je Hadamardova matice $n \times n$. Potom $n = 1, 2$ nebo je dělitelné čtyřmi.

Nápočeda. Nejprve zkuste dokázat dělitelnost dvěma (s výjimkou $n = 1$). Pokud H je Hadamardova matice, můžeme s ní provádět určité úpravy, které „hadamardovost“ zachovávají.

Základní hypotéza Hadamardových matic říká, že Hadamardova matice existuje pro každé $n = 4k$. Je známo pouze několik různých konstrukcí, z nichž dostaneme Hadamardovy matice pouze pro některé řády.² Ukážeme si Sylvesterovu konstrukci pro $n = 2^k$. Pokud vymyslíte či nastudujete nějakou jinou konstrukci a naučíte mě ji, můžete dostat bonusové body.

Úloha 10.2. Dokažte, že existuje Hadamardova matice H_n velikosti $n \times n$ pro každé $n = 2^k$.

Nápočeda. Zkuste objevit induktivní konstrukci, která vytvoří H_{2n} nějakým způsobem z matice H_n . Také můžete využít Kroneckerův součin matic, který se definuje takto: Nechť A je matice $m \times n$ a B je matice $p \times q$. Kroneckerův součin $A \otimes B$ je matice $mp \times nq$ tvořená $m \times n$ bloky velikosti $p \times q$ tak, že blok na souřadnicích (i, j) je matice $a_{i,j}B$. Jestliže A a B jsou Hadamardovy matice, jak vypadá $A \otimes B$? Příklad součinu $A \otimes B$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{potom} \quad A \otimes B = \left(\begin{array}{c|cc|cc} 1 & 2 & 3 & & \\ \hline 2 & -1 & 4 & -2 & 6 & -3 \\ \hline 4 & & 5 & & 6 & \\ \hline 8 & -4 & 10 & -5 & 12 & -6 \end{array} \right).$$

Na závěr dokažme, že Hadamardovy matice jsou extremální matice pro následující větu. Objevil ji sám Hadamard v roce 1893, čímž započal zkoumání Hadamardových matic.

Úloha 10.3. Mějme matici A velikosti $n \times n$, že $|a_{i,j}| \leq 1$ ve všech pozicích (i, j) . Potom platí $|\det(A)| \leq n^{n/2}$ a rovnosti se nabývá právě tehdy, když A je Hadamardova matice.


Nápočeda. Využijte toho, že absolutní hodnota determinantu odpovídá objemu rovnoběžnostěnu určeného řádky matice. Pokud máme rovnoběžnostěn určený vektory $\mathbf{x}_{(1)}, \dots, \mathbf{x}_{(n)}$, jaký je jeho maximální objem v závislosti na normách $\|\mathbf{x}_{(1)}\|, \dots, \|\mathbf{x}_{(n)}\|$? A kdy se tohoto maxima přesně nabývá?

11 Determinují determinanty perfektní párování? (25 bodů)

V této úloze si ukážeme jednu kombinatorickou aplikaci determinantů. Párování P je množina hran, které nesdílejí koncové vrcholy. Tedy žádný vrchol grafu je incidenční s nejvýše jednou hranou z P . Párování je *perfektní*, pokud obsahuje $\frac{n}{2}$ hran, kde n je počet vrcholů grafu; tedy

²Otevřené řády do dvou tisíc jsou 668, 716, 892, 1004, 1132, 1244, 1388, 1436, 1676, 1772, 1916, 1948 a 1964. Například matice řádu 428 byla zkonstruována teprve nedávno, v IPM v Tehránu v roce 2005.

každý vrchol je spárovaný s nějakým jiným. Pochopitelně ne každý graf obsahuje perfektní párování. Minimálně musí být počet vrcholů sudý, aby vůbec perfektní párování mohlo existovat. Na obrázku jsou pro graf vlevo vyznačena dvě různá perfektní párování, pro graf vpravo žádné perfektní párování neexistuje. (Proč?)



Pro jednoduchost se v této úloze zaměříme na bipartitní grafy. Mějme bipartitní graf G s dvěma partitami $U = \{u_1, \dots, u_m\}$ a $V = \{v_1, \dots, v_n\}$. Ten lze popsat incidenční matici partit I_G velikosti $m \times n$ takovou, že

$$(I_G)_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{pokud } u_i v_j \in E(G), \\ 0, & \text{pokud } u_i v_j \notin E(G). \end{cases}$$

Například pro níže uvedený graf G dostaneme následující matici I_G :

$$I_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Aby perfektní párování vůbec mohlo existovat, musí platit $|U| = |V|$, tedy matice I_G musí být čtvercová. Vaším úkolem je zjistit, jaký je vztah mezi $\det(I_G)$ a existencí perfektního párování.

Úloha 11.1. Dokažte, že pokud $\det(I_G) \neq 0$, graf G má nutně perfektní párování.

Úloha 11.2. Rozhodněte a zdůvodněte, zda platí i obrácená implikace: Pokud G obsahuje perfektní párování, potom $\det(I_G) \neq 0$. Je nějaký vztah mezi hodnotou determinantu a počtem různých perfektních párování?

Poznámka. Výše uvedený vztah lze zobecnit i na nebipartitní grafy, i když je to maličko komplikovanější a souvisí to s počtem cyklických pokrytí grafu. Přesný počet perfektních párování bipartitního grafu je roven permanentu $\text{perm}(I_G)$, což je „determinant bez znaménka“:

$$\text{perm}(A) = \sum_{\pi \in S_n} \prod_{i=1}^n a_{i,\pi(i)}.$$

Určit počet perfektních párování i pro bipartitní graf (a tedy i výpočet permanentu matic obsahujících pouze nuly a jedničky) je $\#P$ -úplný problém, což znamená, že pro to (pravděpodobně) neexistuje polynomiální algoritmus.³ Zatímco determinant můžeme spočítat efektivně, drobná změna v definici na permanent způsobí, že se tato formule efektivně určit nedá.

³Třída $\#P$ obsahuje počítací verze problémů z NP. Například problém existence hamiltonovské kružnice patří do NP a příslušný problém určení počtu různých hamiltonovských kružnic patří do $\#P$. Pochopitelně každý problém z $\#P$ je alespoň tak těžký jako příslušný rozhodovací problém v NP. Problém je $\#P$ -úplný, pokud je to nejtěžší problém v $\#P$.

12 Po stopách matic (25 bodů)

Pro čtvercovou matici A definujme její *stopu* $\text{tr}(A)$ jako součet prvků na diagonále:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i}.$$

Na přednášce jste si pomocí charakteristického polynomu dokázali, že stopa $\text{tr}(A)$ je rovna součtu vlastních čísel A . V této úloze ukážeme alternativní důkaz spolu s dalšími vlastnostmi stopy.

Je snadné nahlédnout, že stopa je lineární v koeficientech matic, tedy

$$\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B) \quad \text{a} \quad \text{tr}(cA) = c \cdot \text{tr}(A).$$

Stopa se nechová vůči součinu matic tak pěkně jako determinant, obecně $\text{tr}(AB)$ je zcela rozdílná od $\text{tr}(A)\text{tr}(B)$. Pro stopu však platí následující *cyklická vlastnost*:

Úloha 12.1. Dokažte pro libovolné matice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ a $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, že platí

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA). \quad (1)$$

Poznamenejme, že také existuje velice hezká formule pro $\text{tr}(C^T D)$ v řeči Hadamardova maticového součinu \circ , což je součin po složkách. Nyní už je snadné dokázat, že maticová podobnost zachovává stopu a že stopa je rovna součtu vlastních čísel. Tedy stopa je vlastností lineárního zobrazení a nezáleží na konkrétní volbě báze.

Úloha 12.2. Dokažte, že maticová podobnost nemění stopu, tedy $\text{tr}(SAS^{-1}) = \text{tr}(A)$.

Úloha 12.3. Nechť $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ jsou vlastní čísla matice A . Dokažte, že

$$\text{tr}(A) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n.$$

Nakonec si ukážeme alternativní definici stopy, podobně jako jsme v úloze 8, kdy jsme charakterizovali determinant pomocí vlastností. Překvapivě výše popsané vlastnosti určují stopu skoro jednoznačně. Aby byl popis jednoznačný, musíme zvolit hodnotu stopy pro jednu z matic, která ji má nenulovou.

Úloha 12.4. Nechť $f : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ je lineární zobrazení, které splňuje vlastnost (1) a pro které $f(I) = n$. Dokažte, že potom $f = \text{tr}$.

Ná pověda. Stačí pochopit chování f pro matice $E_{(i,j)}$, které mají všechny koeficienty nulové a pouze jeden koeficient na pozici (i, j) roven jedné. To jsou vlastně vektory kanonické báze pro prostor čtvercových matic $\mathbb{R}^{n \times n}$. Stačí tedy ukázat, že $f(E_{(i,j)}) = \text{tr}(E_{(i,j)})$.

Existuje pro stopu i nějaká pěkná geometrická motivace? O determinantu jsme si na cvičení řekli, že počítá transformaci objemu lineárního zobrazení. Překvapivě stopa souvisí s touto motivací, neboť popisuje derivaci determinantu, tedy lokální změnu objemu v nějaké sérii transformací. Přesněji vztah popisuje Jacobiho formule.

Mějme nějakou sérii matic $A(x)$, kde $x \in \mathbb{R}$, a každý z koeficientů je nějaká derivovatelná funkce x . Například nechť

$$R(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

je série matic 2×2 reprezentující rotace v rovině. Jacobiho formule říká, že

$$\frac{d}{dx} \det A(x) = \text{tr} \left(\text{Adj}(A) \cdot \frac{dA}{dx} \right),$$

kde poslední derivace je po členech a $\text{Adj}(A)$ je adjungovaná matici, jejíž koeficienty jsou tvořené determinanty s vyškrtnutým i -tým řádkem a j -tým sloupcem (s příslušným znaménkem).

Snadným výpočtem pro $R(\varphi)$ zjistíme, že $\frac{d}{d\varphi} \det R(\varphi) = 0$. To dává smysl, neboť všechny matice rotace jsou ortogonální a mají stejný determinant.